

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
КОЛОПРОКТОЛОГИИ ИМЕНИ А.Н.РЫЖИХ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих»
Минздрава России)

ул. Саяма Адиля, д.2, Москва, 123423
тел.:8(499)199-15-67, факс: 8(499)199-04-09
e-mail: info@gnck.ru
ОКПО 01966590, ОГРН 1037739408761
ИНН/КПП 7734087696/773401001

№ _____

На № _____ от _____

«Утверждаю»
Директор ФГБУ
«ГНЦК им. А.Н.Рыжих»
Минздрава России,
д.м.н., профессор
Ю.А. Шелыгин
10 июня 2015 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Диссертация на тему «Ректосакропексия в лечении больных выпадением прямой кишки» выполнена на базе ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России.

Войнов Михаил Андреевич в 2009 г. окончил с отличием Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «Лечебное дело». В период подготовки диссертации Войнов Михаил Андреевич проходил обучение в аспирантуре в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России.

Научный руководитель - доктор медицинских наук, Титов Александр Юрьевич, работает в должности руководителя отдела общей и реконструктивной колопроктологии Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Оценка выполненной соискателем работы.

Работа посвящена проблеме улучшения результатов лечения больных выпадением прямой кишки.

Основой работы является сравнительное исследование ректосакропексии и заднепетлевой ректопексии при лечении ректального пролапса. В ходе работы продемонстрировано, что частота развития рецидива пролапса после ректосакропексии не превышает таковую после заднепетлевой ректопексии. При этом ухудшение моторики толстой кишки увеличивает этот риск в 5,66 раз. Кроме этого, ректосакропексия не приводит к усилению запора в отдаленном послеоперационном периоде, в то время как заднепетлевая ректопексия статистически достоверно замедляет моторику толстой кишки. В результате проведенной работы доказано, что анальноедержание улучшается после хирургического лечения у всех пациентов с 1-2 степенью недостаточности анального сфинктера вне зависимости от метода фиксации прямой кишки.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.

Автором произведен поиск теоретического обоснования преимуществ ректосакропексии при выпадении прямой кишки. Автором разработана методологическая концепция предоперационного обследования пациентов, разработана новая программа физиотерапевтического лечения (БОС-терапии) диссинергии мышц тазового дна при выпадении прямой кишки. Соискатель участвовал в подготовке пациентов к оперативному вмешательству, выполнял этапы оперативного вмешательства и осуществлял ведение пациентов в послеоперационном периоде. Автор лично проводил наблюдение всех пациентов в отдаленном периоде со сбором информации относительно эффективности проведенного лечения, а также осуществлял сравнительный анализ результатов исследований и статистическую обработку полученных данных. Основные результаты проводимого исследования были доложены на конференциях, подготовлены публикации по теме выполненной работы в отечественных и зарубежных журналах

Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Для хирургического лечения больных выпадением прямой кишки применен правильный метод выполнения операции, являющийся актуальным в настоящий момент. Использованы современные методики сбора и обработки исходной информации. Оценка достоверности результатов исследования выявила, что при сравнении авторских данных после ректосакропексии и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике, имеются достоверные соответствия. Установлено качественное и количественное совпадение отдаленных результатов лечения у больных с выпадением прямой кишки, с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике.

Новизна и практическая значимость полученных результатов.

Научная новизна исследования убедительно характеризует научную значимость работы. Автором изучена новая методика, применяемая при лечении выпадения прямой кишки – ректосакропексия.

В результате работы впервые статистически доказано, что состояние моторики толстой кишки после операции является неблагоприятным фактором риска развития рецидива выпадения прямой кишки. Впервые разработан и внедрён в клиническую практику метод консервативной подготовки к операциям по поводу ВПК, включающий комплексную оценку состояния мышц тазового дна и последующую БОС-терапию

Установлено, что выполнение ректосакропексии улучшает исход лечения пациентов с выпадением прямой кишки. Полученные результаты позволяют судить о высокой эффективности ректосакропексии по сравнению с заднепетлевой ректопексией, в первую очередь, о её меньшем отрицательном влиянии на развитие запора после операции.

Разработана программа физиотерапевтического лечения диссинергии мышц тазового дна – БОС-терапия – при выпадении прямой кишки, которая

позволяет улучшить функциональные результаты лечения данной категории пациентов.

Разработан научно-обоснованный метод оценки риска развития рецидива выпадения прямой кишки, который позволяет проводить адекватную реабилитацию пациентов, направленную на профилактику развития запора в послеоперационном периоде.

Разработана программа лечения с учетом особенностей ведения пациентов с солитарными язвами прямой кишки, которая позволяет более эффективно проводить как хирургическое лечение, так и послеоперационную реабилитацию у данной категории больных.

Значение полученных соискателем результатов исследования

Полученные автором данные по изучению ректосакропексии при выпадении прямой кишки внедрены в лечебную практику работы ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России и педагогическую практику кафедры колопроктологии ФГБУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования».

Ценность научных работ соискателя

В центральной отечественной и зарубежной печати автором опубликовано 5 работ, в которых достаточно полно отражены основные положения диссертационного исследования. Освящены такие вопросы, как анализ литературы, посвященной лечению выпадения прямой кишки, применение метода БОС-терапии при лечении обструктивной дефекации, непосредственные и отдаленные результаты ректосакропексии, а также особенности морфологии и нейрофизиологических изменений при опущении промежности.

Область исследования, выполненного Войнова М.А., соответствует специальности 14.01.17 – Хирургия. Медицинские науки.

Полнота изложения материалов диссертации.

Материалы диссертации доложены на:

- Научно-практической конференции ФГБУ «Государственный научный центр колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, 2013 г.
- Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы колопроктологии», Смоленск, 2014 г.
- Девятом ежегодном съезде Европейской ассоциации колопроктологов, Барселона, 2014 г.
- Международном объединенном конгрессе Ассоциации колопроктологов и первом ESCP/ECCO региональном мастер-классе, Москва, 2015 г.

По теме диссертации опубликованы 5 печатных работ, в том числе 4 в журналах, рекомендованных ВАК для представления материалов кандидатских диссертаций:

1. Войнов М. А. Хирургические методы лечения выпадения прямой кишки (обзор литературы) // Колопроктология. – 2013. - № 4 (46). – С. 41-47.

2. Шельгин Ю. А., Титов А. Ю., Шехтер А. Б., Мудров А. А., Бирюков О. М., Джанаев Ю. А., Войнов М. А. Характер морфологических и нейрофизиологических изменений у женщин с синдромом опущения промежности // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. - 2014. - Т.24. - №1. - С. 71-82.

3. Титов А. Ю., Бирюков О. М., Фоменко О. Ю., Войнов М. А. Применение БОС-терапии в лечении проктогенных запоров у взрослых пациентов // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. - 2014. - Т. 24. - №6. - С.78-81.

4. Титов А.Ю., Бирюков О.М., Фоменко О.Ю., Тихонов А.А., Войнов М.А. «Опыт ректосакропексии в лечении больных выпадением прямой кишки» Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии - 2015. - Т. 25. - №1. - С. 43-48.

5. Titov A., Biryukov O., Tikhonov A., Voinov M. Ventral rectopexy in patients with rectal prolapse // Colorectal Disease. – 2014. - №16:3. – p. 42.

Диссертация соответствует специальности 14.01.17 – Хирургия.

Диссертация «Ректосакропексия в лечении больных выпадением прямой кишки» Войнова Михаила Андреевича рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – Хирургия. Медицинские науки.

Заключение принято на совместной научно-практической конференции коллектива сотрудников отдела общей колопроктологии с группой изучения семейного аденоматоза и отдела общей и реконструктивной колопроктологии ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России и кафедры колопроктологии ФГБУ ДПО «РМАПО» 10 июня 2015 г.

Присутствовало на заседании 25 человек, в том числе докторов медицинских наук – 4, из них по специальности выполненной работы 14.01.17. – Хирургия 3 человека.

Результаты голосования: «за» - 25 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол № 2 от «10» июня 2014 года.

Заместитель директора
по научно-лечебной работе ФГБУ
«ГНЦК им. А.Н. Рыжих»
Минздрава России,
к.м.н.

Кашников В.Н.

Ученый секретарь
ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих»
Минздрава России,
д.м.н.

Титов А.Ю.